

切株注入法の再生竹抑制効果と土壤散布法との比較

江崎功二郎

I はじめに

切株注入法はグリホサート系除草剤（液剤）を伐採後の切株に注入し、効率良く地下茎を枯死させる技術である（宮崎・西尾、2007；池田、2016；江崎・池田、2018）。この技術は竹稈注入の応用技術で、夏～秋期に株あたり 5～15cc 注入する。この除草剤の特性として細胞分裂が盛んな新葉や地下茎に移行することが知られており、除草剤を地下茎へスムーズに移行させるために伐採後、1 ヶ月以内に注入する。一方、塩素酸系除草剤の土壤散布も再生竹抑制効果が高いとされる技術である（江崎ら、2011；2017；江崎、2013；江上ら、2015；江上、2017）。今回、石川県内の 3 箇所に調査地を設置し、切株注入法の再生竹抑制効果を明らかにするとともに、土壤散布法と比較したので、その結果について報告する。

なお、本研究は農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業委託事業「侵略的拡大竹林の効率的駆除法と植生誘導技術の開発（H27～29年）」によって行われた。また、森林総合研究所関西支所の鳥居厚志博士をはじめとして、本プロジェクトの共同研究者の皆様には貴重なご意見を頂いた。厚く感謝申し上げる。

II 調査地および方法

石川県金沢市坪野、津幡町大畠および能登町七見のモウソウチク林において、それぞれ 15×15m (225m²) のグリホサート系除草剤の切株注入区、伐倒のみ区および塩素酸系除草剤の土壤散布区を等高線に沿って順番に並べ、それぞれが接するように設置した。その後、竹稈を生稈と枯死稈と区別してカウントし、各区の DBH を測定した。ただし、2cm 未満の竹は除外した。

土壤散布を伐採後に行うと、伐採竹稈の棚積み場所の散布が困難になり、竹の再生を十分に抑制できない。そのため、伐採直前に土壤散布を行った。土壤散布は江崎ら（2011）を参考に、先端を切ったジョウロで 11.5kg のクロレート S 粒剤をムラがないように全面散布した。

竹切株注入は渥美ら（2017）を参考に、伐採後



図-1 調査地の位置

の竹切株の上部から穴を開け、ラウンドアップマックスロード（日産工業（株））原液 5cc／株を注入し、布テープで塞いだ。伐採竹稈の棚積み場所では竹稈を高切り、電動ドリルで竹稈の側面に穴を開け、同量の除草剤を注入し布テープで塞いだ。

坪野調査区における土壤散布、竹稈伐採および切株注入は、それぞれ 2016 年 11 月 2 日、11 月 16 日および 11 月 22 日に行った。大畠調査区においては、それぞれ 2016 年 11 月 8 日、11 月 17～21 日および 11 月 22 日に行った。七見調査区においては、それぞれ 2017 年 3 月 7 日、3 月 8～10 日および 3 月 22 日に行った。

坪野と大畠調査地における竹再生本数のカウントは 2017 年 10 月 17 日、そして七見調査地は 10 月 20 日に行った。観察された再生竹の多くはササ状の小竹または葉が縮れた矮性の竹であったが、これらは区別しないでカウントした。また、同一

表-1 各試験区の親竹本数とサイズ

場所	処理区	本数			DBH (cm)
		生竹	枯竹	計	
金沢市坪野	切株注入区	171	32	203	93.9
	伐採のみ区	125	39	164	97.7
津幡町大畠	土壤散布区	142	36	178	100.8
	切株注入区	262	72	334	95.9
能登町七見	伐採のみ区	195	58	253	92.4
	土壤散布区	80	29	109	91.4
	切株注入区	290	64	354	9.3
	伐採のみ区	280	29	309	8.9
	土壤散布区	201	22	223	10.2

箇所から生育している竹であっても、地上部で区別できた場合はそれぞれカウントした。

竹の再生率および抑制効果は、以下によって算出した。

$$\text{再生率} (\%) = (\text{再生竹数} + 1) / (\text{親竹本数} + 1) \times 100$$

$$\text{抑制効果} (\%) = (1 - \text{処理区の再生率} / \text{伐採のみ区の再生率}) \times 100$$

III 結果と考察

坪野調査地における伐採のみ区の再生本数は 82 本で再生率は 50.3% であった。一方、切株注入区および土壤散布区の再生本数はそれぞれ 9 および 0 本であり、再生率は 4.9 および 0.6% であった。そのため、グリホサート系除草剤の切株注入および塩素酸系除草剤の土壤散布における再生竹抑制効果は、それぞれ 90.3 および 98.9% になった。

大畠調査地における伐採のみ区の再生本数は 176 本で再生率は 69.7% であった。一方、切株注入区および土壤散布区の再生本数はそれぞれ 131 および 4 本であり、再生率は 39.4 および 4.5% であった。そのため、切株注入および土壤散布における抑制効果は、それぞれ 43.5 および 93.5% になった。また、七見調査地における伐採のみ区の再生本数は 381 本で再生率は 123.2% であった。一方、切株注入区および土壤散布区の再生本数はそれぞれ 114 および 41 本であり、再生率は 32.4 および 18.8% であった。そのため、切株注入および土壤散布における抑制効果は、それぞれ 73.7 および 84.8% になった。

農薬登録におけるグリホサート系除草剤の竹 1 本あたり注入量は 5~15cc である（農林水産消費安全技術センターHP 農薬登録情報）。池田（2016）は石川県金沢市において、1 本あたり注入量を 5cc および 15cc として比較試験を行った結果、再生抑制効果は 83.6 および 82.6% になり、注入量の違いは再生竹抑制効果に影響を与えたなかった。今回 3 試験の注入量は下限値であり、その抑制効果は、低い順に 43.5%、73.7% および 90.3% であった。さらに、宮崎・西尾（2007）が奈良県で行った 1 本あたり 5cc の抑制効果を算出すると 84.0% であり、渥美ら（2017）が石川県白山市の 10 月および 12 月に行った同量の抑制効果は 70.9 および 85.7% であった（未発表データを含む）。一方、中

表-2 竹の再生率と抑制効果

場所	処理区	再生本数	再生率 [*] (%)	抑制効果 ^{**} (%)
金沢市坪野	切株注入区	9	4.9	90.3
	伐採のみ区	82	50.3	—
	土壤散布区	0	0.6	98.9
津幡町大島	切株注入区	131	39.4	43.5
	伐採のみ区	176	69.7	—
	土壤散布区	4	4.5	93.5
能登町七見	切株注入区	114	32.4	73.7
	伐採のみ区	381	123.2	—
	土壤散布区	41	18.8	84.8

*再生率 = (再生竹数 + 1) / (親竹本数 + 1) × 100

**抑制効果 = (1 - 処理区の再生率) / 伐採のみ区の再生率) × 100

山（2015；2016）が群馬県で行った 1 本あたり 10cc の 4 試験の抑制効果を算出すると、低い順に 33.7%、84.3%、89.0% および 93.7% であった。この技術はグリホサート系除草剤が地下茎を移動し、地下茎を枯死させるため、注入量の多少が地下茎の枯死量および再生竹の発生に影響を与えると考えられるが、5~15cc の注入範囲においては抑制効果に明確な違いは認められない。

今回の土壤散布の再生竹抑制効果は 84.8~98.9% で高い効果が認められた。これらを切株注入区の抑制効果と比較すると 8.6~50.0% 高い値となる。土壤散布された塩素酸系除草剤は、江上ら（2015）の地下部の調査からも明らかのように、地下茎の芽子や（細）根に作用し、酸化・枯死させる。薬剤が面的に作用するため、豆腐を切ったように正確な範囲の駆除が実行できる。一方、切株注入においては切株より繋がっている地下茎のみに薬剤が移行するため、試験区境界より先の地下茎にも影響を及ぼす一方で、別の場所から試験区へ侵入している地下茎を枯殺することが出来ない（渥美ら、2017）。伊藤（2007）は、10cc 注入した切株から地下茎の変色が最大で 4m 以上にも及んだことを報告している。そのため、枠調査では土壤散布処理が再生を抑制した本数を示している一方で、切株注入区では枠外の効果を示すことが難しく、侵入する地下茎から生長する竹を抑制できない。そのため、このような枠調査においては切株注入区の再生竹抑制効果は実際の抑制効果より低く評価される可能性がある。

引用文献

渥美幸大・池田虎三・江崎功二郎（2017）グリホ

- サート系除草剤の竹切株注入による再生竹の抑制効果と空間分布. 石川県林試研報 48 : 1-5
- 江上 浩 (2017) 実用的な放置竹林駆除対策手法の開発. 森林科学 79 : 40-43
- 江上 浩・久本洋子・鈴木重雄・高橋幸貴・須藤智博・尾川新一郎・若林利昌・遠藤良太 (2015) 事前伐採と塩素酸ナトリウム粒剤（クロレートS）全面土壤散布の組み合わせによる放置マダケ林の防除. 森林防疫 64 : 20-28
- 江崎功二郎 (2013) 竹林の駆除技術. 植調 47(7) : 3-9
- 江崎功二郎・池田虎三 (2018) 再生竹を抑制する技術「竹切株注入法」. 林業技術 2018(2) : 34-38
- 江崎功二郎・池田虎三・小谷二郎 (2017) 除草剤を利用した再生竹抑制技術. 山林 1600 : 21-28
- 江崎功二郎・石田洋二・柳田 亨・前浜 直・柳場英代 (2011) 塩素酸系除草剤の竹稈注入によるモウソウチクの枯損と再生経過. 林業と薬剤 198 : 7-10.
- 池田虎三 (2016) 薬剤の伐痕注入による竹林の効率的な駆除方法. 中森研 64 : 55-56
- 伊藤孝美 (2007) 薬剤注入によるモウソウチクの反応. 林業と薬剤 179 : 9-14
- 宮崎祐子・西尾起一 (2007) 竹林の拡大防止法としての竹切株への薬剤注入試験. 奈良県森技セ研報 36 : 67-69
- 中山ちさ (2015) 竹林の整備と里山環境の復元に関する調査・研究 (1) 竹林の新しい整備手法の検討 (1). 群馬県林試業報平成 26 年度 : 32-33
- 中山ちさ (2016) 竹林の整備と里山環境の復元に関する調査・研究 (1) 竹林の新しい整備手法の検討 (2). 群馬県林試業報平成 27 年度 : 35-36